

© ЧАНДИРЛИ С.А., 2015

УДК 616.127-005.4-036.86-053]:312.6(470+571) «2004–2013»

Чандирли С.А.

СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДИНАМИКЕ ЗА 10 ЛЕТ (2004–2013)

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, 123995, г. Москва

В статье дан анализ структуры первичной инвалидности вследствие ишемической болезни сердца в динамике за 10 лет с учетом молодого, среднего и пенсионного возраста. Удельный вес инвалидов молодого возраста небольшой, колеблется, уменьшается до 2009 г., увеличивается в 2010–2013 гг., удельный вес инвалидов среднего возраста увеличивается, удельный вес инвалидов пенсионного возраста уменьшается. В среднем инвалиды молодого возраста составляют 4,2%, среднего – 22,8%, пенсионного – 73% от общего числа.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца; структура; первичная инвалидность; Российская Федерация; молодой, средний, пенсионный возраст.

Для цитирования: Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 2015; 18(1): 25–26.

THE STRUCTURE OF PRIMARY DISABILITY DUE TO ISCHEMIC DISEASE BASED ON AGE IN THE RUSSIAN FEDERATION IN DYNAMICS FOR 10 YEARS (2004–2013)

Chandirli S.A.

Russian Medical Academy of Postgraduate Education, 123995, Moscow, Russian Federation

The paper analyses the structure of primary disability due to coronary heart disease in dynamics for 10 years with the young, middle and retirement age. The share of young people with disabilities small ranges, reduced to 2009, increased in 2010–2013, the proportion of disabled people of middle age increases; the proportion of disabled people of retirement age is reduced. On average, disabled young adults make up 4.2%, an average of 22.8%, 73% of the pension of the total.

Key words: coronary heart disease; structure; Primary disability; age; The Russian Federation; young, middle, retirement age.

Citation: Mediko-sotsyal'naya ekspertiza i reabilitatsiya. 2015; 18(1): 25–26. (In Russ.)

Correspondence to: Sevda Chanderli – MD, PhD, e-mail: cha-seva@rumbler.ru.

Received 15.10.14

Инвалидность вследствие ишемической болезни сердца (ИБС) является актуальной проблемой во всех возрастных группах.

У лиц молодого возраста (18–44 лет) число инвалидов составило 17 818–17 453 человека в 2004–2005 гг., в последующие годы постоянно снижается до 10 793 человек в 2006 г. (–38,2%), до 7172 человек в 2007 г. (–33,5%) и в последующие годы до 5451–5125 человек в 2012–2013 гг. всего инвалидами признаны за 10 лет 87,5 тыс. человек, в среднем в год 8,7 тыс. инвалидов.

Число инвалидов вследствие ИБС среднего возраста (мужчины 45–59 лет, женщины 45–54 года) значительно больше и составляет 41 386 человек в 2004 г., увеличивается до 50 280 человек в 2005 г. (+21,5%), до 56 437 человек в 2006 г. (+12,2%), в последующие годы снижается до 47 830 человек в 2008 г. (–4%), до 45 914 человек в 2011 г., до 38 036 человек в 2013 г.; всего за 10 лет инвалидами признаны 469 310 человек в среднем возрасте, а в среднем в год 46,9 тыс. инвалидов.

Больше всего инвалидов вследствие ИБС в пенсионном возрасте. В 2004 г. они составили 258 705 человек, число увеличилось до 320 700 человек в 2005 г. (+24%), в последующие годы выявляется четкая тенденция снижения числа инвалидов до 158 479 человек в 2007 г. (–33,5%), до 87 404 человек в 2010 г., до 63 895 человек в 2013 г., всего за 10 лет инвалидами признаны 1,5 млн человек, а в среднем в год – 150,6 тыс. инвалидов.

Сведения о численности инвалидов вследствие ИБС в динамике за 10 лет с учетом возраста даны в табл. 1.

Рассчитана структура инвалидности вследствие ИБС по возрасту в динамике за 10 лет (2004–2013).

Удельный вес инвалидов молодого возраста составил 5,6–4,5% в 2004–2005 гг., затем снижается до 3,3–3,4% в 2006–2008 гг., в 2009 г. удельный вес увеличивается с 3,8% до 4,3–4,4% в 2010–2011 гг., до 4,5–4,8% в 2012–2013 гг., а в среднем равен 4,2% от общего числа.

Удельный вес инвалидов среднего возраста составляет 13,0–12,9% в 2004–2005 гг., в последующие годы значительно увеличивается до 30,6% в 2009 г., до 35,1% в 2011 г., до 35,5 в 2013 г., а в среднем составляет 22,8% от общего числа.

Удельный вес инвалидов пенсионного возраста высокий и равен 81,4–82,6% в 2004–2005 гг., снижа-


Для корреспонденции:

Чандирли Севда Айдыновна – канд. мед. наук, ассистент каф. гериатрии и медико-социальной экспертизы; 123995, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, e-mail: cha-seva@rumbler.ru.

Таблица 1

Общие сведения о первичной инвалидности вследствие ИБС с учетом возраста в Российской Федерации в динамике за 10 лет (2004–2013)

Год	Общее число инвалидов вследствие ишемической болезни сердца, абс.	В том числе, абс.					
		до 44 лет		М – 45–59 лет, Ж – 45–54 года		М – 60 лет и старше, Ж – 55 лет и старше	
		абс.	темп роста или убыли, %	абс.	темп роста или убыли, %	абс.	темп роста или убыли, %
2004	317 906	17 818	–	41 386	–	258 702	–
2005	388 433	17 453	-2,0	50 280	+21,5	320 700	+24,0
2006	305 697	10 793	-38,2	56 437	+12,2	238 467	-25,6
2007	215 457	7 172	-33,5	49 806	-11,7	158 479	-33,5
2008	177 674	6 011	-16,2	47 830	-4,0	123 833	-21,9
2009	158 477	5 986	-25,0	48 546	+1,5	103 945	-16,1
2010	141 099	6 006	+3,3	47 689	-1,8	87 404	-15,9
2011	130 671	5 714	-4,9	45 914	-3,9	79 043	-9,6
2012	120 773	5 451	-4,6	43 386	-5,5	71 936	-9,0
2013	107 056	5 125	-6,0	38 036	-12,3	63 895	-11,2
Итого ...	2 063 243	87 529	–	469 310	–	1 506 404	–
В среднем за год	206 324	8 753	–	46 931	–	150 640	–



Структура первичной инвалидности вследствие ИБС по возрасту в динамике за 10 лет (2004–2013).

Таблица 2
Структура первичной инвалидности вследствие ИБС с учетом возраста в Российской Федерации в динамике за 10 лет (2004–2013)

Год	Структура, %			Всего
	молодой возраст	средний возраст	пенсионный возраст	
2004	5,6	13,0	81,4	100,0
2005	4,5	12,9	82,6	100,0
2006	3,5	18,5	78,0	100,0
2007	3,3	23,1	73,6	100,0
2008	3,4	26,9	69,7	100,0
2009	3,8	30,6	65,6	100,0
2010	4,3	33,8	61,9	100,0
2011	4,4	35,1	60,5	100,0
2012	4,5	35,9	59,6	100,0
2013	4,8	35,5	59,7	100,0
Итого ...	4,2	22,8	73,0	100,0
В среднем за год	4,2	22,8	73,0	100,0

ется до 78,0–73,6% в 2006–2007 г., до 61,9–60,5% в 2010–2011 гг., до 59,6–59,7% в 2012–2013 гг., а в среднем составляет 73% от общего числа.

Сведения о структуре инвалидности вследствие ИБС с учетом возраста даны в табл. 2 и на рисунке.

Таким образом, статистический и графический анализ четко показал, что удельный вес инвалидов молодого возраста небольшой, но колеблется, а в среднем равен 4,2% от общего числа.

Удельный вес инвалидов среднего возраста увеличивается с 13% в 2004 г. до 35,5% в 2013 г., а в среднем за год равен 22,8% от общего числа.

Удельный вес инвалидов пенсионного возраста снижается с 81,4% в 2004 г. до 59,7 в 2013 г., а в среднем за год равен 73% от общего числа.

Особое внимание следует обратить на постоянный рост удельного веса инвалидов вследствие ИБС у лиц среднего возраста. Это свидетельствует о неблагоприятной ситуации у населения среднего возраста, что требует дальнейшего изучения.

Поступила 15.10.14